

«Современные методы контрацепции»

1. Противопоказанием к назначению ЛНГ-ВМС Мирена является все, кроме:
 - рак молочной железы
 - эндометриоз
 - инсульт в анамнезе
 - миома матки с деформацией полости
 - верно все перечисленное
2. Содержание этинилэстрадиола в микродозированных КОК составляет
 - 50 мкг/сут
 - 30-35мкг/сут
 - 40мкг/сут
 - 20мкг/сут
 - Менее 20 мкг/сут
3. В какой срок после родов назначают монофазный ОК мини-пили?
 - сразу после родов
 - через 1 месяц после родов
 - через 6-8 недель после родов
 - через 6 месяцев после родов
 - не назначают, противопоказаны при лактации
4. Механизм контрацептивного действия КОК заключается во всем, кроме:
 - Подавление овуляции
 - Сгущение шеечной слизи
 - Изменения эндометрия, препятствующие имплантации
 - Снижение перестальтики маточных труб
 - Создают механическое препятствие для продвижения сперматозоидов
5. Прогестагеном, относящимся к производным спиронолактона, является:
 - Дезогестрел
 - Хлормадинона ацетат
 - Диеногест
 - Дроспиренон
 - Левоноргестрел
6. Противопоказаниями к назначению КОК является все, кроме:
 - Период грудного вскармливания
 - Курение более 15 сигарет в день
 - Тромбоз глубоких вен
 - Рак молочной железы
 - Рак эндометрия

7. К парентеральным контрацептивным препаратам относятся все, кроме:

- Подкожные импланты
- Трансдермальная контрацептивная система
- КОК
- Внутриматочная гормональная система
- Вагинальное гормонсодержащее кольцо

8. Какие препараты наиболее приемлемы для экстренной контрацепции?

- простинон
- линдинет
- джес
- метод Юзпе
- ничего из перечисленного

9. Лечебные эффекты КОК заключаются во всем, кроме

- Этиологическое лечение миомы матки
- регуляции менструального цикла
- устранения дисменореи
- снижения гиперандрогении
- устранения меноррагии

10. Наиболее приемлемым методом контрацепции в послеродовом периоде является:

- ВМС
- КОК
- Монофазные прогестагеновые оральные контрацептивы
- Хирургическая стерилизация
- Гормонсодержащие импланты

11. Какие требования предъявляют к контрацептивам, назначаемым в подростковом возрасте?

- высокая эффективность
- доступность
- отсутствие отрицательного влияния на организм
- простота приема
- все перечисленное

12. Противопоказаниями к назначению КОК, является все, кроме:

- Кормление грудью в период менее 6 нед. после родов
- Курение более 15 сигарет в день
- Рак молочной железы
- Фиброаденома молочной железы
- Нарушение всасывания в ЖКТ

13. К гормональным методам контрацепции не относятся:

- посткоитальные
- спермициды
- монофазные ОК
- КОК
- ЛНГ-ВМС

14. Противопоказанием к назначению прогестероновых оральных контрацептивов является:

- Рак молочной железы
- Ожирение
- Артериальная гипертензия
- Эндометриоз
- Рак эндометрия

15. Какой метод контрацепции вы рекомендуете девушке 17 лет, не имеющей постоянного полового партнера?

- ВМС
- спермициды
- «двойной голландский метод»
- метод Юзпе
- все перечисленное