

«Аntenатальная охрана плода»

1. Сроки проведения первого патронажа к беременной:
 - 10 недель
 - 12 недель
 - в течение 10 дней после сообщения из женской консультации о постановке беременной на учет
 - после ухода беременной в декретный отпуск
2. Продолжительность внутриутробного периода в среднем составляет:
 - 280 дней
 - 350 дней
 - 250 дней
 - 200 дней
3. Фаза эмбрионального развития длится:
 - 4 недели
 - 8 недель
 - 12 недель
 - 16 недель
4. Тяжелые пороки развития плода возникают при воздействии повреждающих факторов при сроке беременности:
 - до 8 недель
 - от 10 до 12 недель
 - от 12 до 16 недель
 - от 16 до 20 недели
5. Какое вирусное заболевание, перенесенное беременной в ранние сроки, приводит к порокам развития плода почти в 100 % случаев?
 - грипп
 - краснуха
 - гепатит
 - эпидемический паротит
6. Фаза плацентарного развития плода соответствует срокам беременности:
 - 12 - 38-40 недель
 - 16 - 38-40 недель
 - 20 - 38-40 недель
 - 24 - 38-40 недель
7. Процессы, происходящие в поздний фетальный период внутриутробного развития:
 - формируются внутренние органы
 - формируются внешние части плода
 - формируется плацента

-интенсивно увеличивается длина и масса тела плода

8. Дефицит какого витамина в питании беременной может стать причиной развития патологии центральной нервной системы плода и новорожденного:

-витамина А

-витамина С

-фолиевой кислоты

-никотиновой кислоты

9. Укажите витаминный препарат, оказывающий при передозировке тератогенное действие:

-Ретинол

-токоферол

-рибофлавин

-аскорбиновая кислота

10. Какой поливитаминный препарат рекомендуется принимать беременным и кормящим женщинам:

-Юникап

-Супрадин

-Декамевит

-Элевит Пронаталь

11. Врожденный гипотиреоз развивается в результате дефицита:

-железа

-меди

-йода

-кальция

12. Выберите неверное утверждение:

-витамины, микро- и макроэлементы депонируются в организме плода

-депо витаминов, макро- и микроэлементов необходимо для роста и развития новорожденного

-дефицит витаминов во время беременности не отражается на здоровье новорожденного

-дефицит витаминов, макро- и микроэлементов во время беременности является фактором риска многих заболеваний новорожденного и грудного ребенка

13. Минимальная рекомендуемая дозировка фолиевой кислоты в сутки на протяжении 30 дней до зачатия и как минимум в течение всего I триместра?

-400 мкг/сут

-1000 мкг/сут

-200 мкг/сут

-700 мкг/сут

14. Тактика в случае постановки диагноза пороков развития у плода с неблагоприятным прогнозом для жизни и здоровья ребенка после рождения:

- прерывание беременности по медицинским показаниям проводится до 22 недели беременности

- прерывание беременности по медицинским показаниям проводится независимо от срока беременности

- прерывание беременности по медицинским показаниям проводится до 12 недель беременности

15. К ВПР плода, часто сочетающимся с хромосомными аномалиями, или наличием множественных ВПР, относятся:

-тетрада Фалло

- омфалоцеле

- большой дефект аорто-легочной перегородки

- гемодинамически значимый открытый артериальный проток